

## TABE

# LOXOPROFENO SODICO 60 mg

### Comprimidos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, éste contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, por lo que no debe dárselo a otras personas, aunque presenten los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no se mencionen en este prospecto.

#### Contenido del prospecto:

##### 1) ¿Qué es TABE y para qué se utiliza?

TABE contiene el principio activo loxoprofeno sódico y se utiliza en las siguientes enfermedades. Como antiinflamatorio y analgésico en pacientes con artritis reumatoidea, osteoartritis, dolor lumbar (lumbalgia), periartritis escápulo humeral, síndrome cérico braquial. TABE también puede ser indicado luego de una cirugía, traumatismo o extracción dentaria. Como antitérmico y analgésico se puede indicar a pacientes con inflamación aguda del tracto respiratorio superior.

##### 2) ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar TABE?

No tome TABE, si: • Es alérgico al loxoprofeno o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. • Sufre de Trastornos hematológicos, hepáticos o renales severos. • Sufre de Insuficiencia cardíaca congestiva grave. • Sufre de Asma inducida por aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides.

#### No deben tomar Tabe:

- En embarazo y lactancia no debe utilizarse.
- Mujeres embarazadas a partir del sexto mes de embarazo.
- Mujeres en el período de lactancia.
- Niños o menores de 18 años.

**Advertencias y precauciones:** Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Tabe.

- Ya que el tratamiento con este tipo de droga es un tratamiento de los síntomas, al estar indicado para enfermedades crónicas (tales como artritis reumatoidea, osteoartritis) se recomienda realizar pruebas periódicas de laboratorio.
- Si esta droga se indica para el tratamiento de enfermedades agudas, se debe tener en cuenta lo siguiente:
  - Tabe no debe ser administrado en forma prolongada.
  - Prestar atención ante posibles efectos adversos como disminución excesiva de la temperatura, enfriamiento de las extremidades, entre otros.
  - Se le debe prestar una especial atención a los pacientes mayores durante su administración, ya que este medicamento puede ocultar signos y síntomas frecuentes de infección, Tabe se debería administrar junto con un agente antibacteriano (antibiótico), en caso que el proceso inflamatorio se relacione con una infección.
  - En personas con la presión arterial elevada (hipertensión), puede provocar alteración en el control de la presión.
  - No se debe tomar esta droga junto con otros antiinflamatorios o analgésicos.
  - Ya que Tabe contiene lactosa este medicamento no debe ser tomado por personas que tengan galactosemia congénita, síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa o deficiencia de lactasa.
  - Tabe debe ser administrado con precaución en los siguientes casos:
    - Úlcera péptica activa o antecedentes de úlcera gastroduodenal.
    - Si tiene o ha tenido enfermedades de la sangre (hematológicas) del riñón (renales) o del hígado (hepáticas).
    - Pacientes con asma bronquial.
    - Si tiene o ha tenido enfermedades intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

**Niños y adolescentes:** No administrar este medicamento a niños o menores de 18 años ya que la seguridad y eficacia no han sido establecidas.

**Uso de TABE con otros medicamentos:** Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente o podría tener

que utilizar otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Es especialmente importante que informe a su médico o farmacéutico si está usando medicamentos que contengan alguna de las sustancias indicadas a continuación, ya que pueden interactuar con TABE, por lo que el médico quizás debe adoptar alguna medida especial.

- Warfarina (utilizada para trastornos de la coagulación). - Tolbutamida, clorpropamida (utilizados para tratar los niveles de glucemia).  
- Norfloxacin (utilizado como antibiótico). - Litio (droga de tratamiento psiquiátrico). - Metotrexato (antimetabolito/antineoplásico/inmunomodulador). - Tiazida, hidroclorotiazida (diuréticos).

**Embarazo y Lactancia:** No se sabe si TABE puede perjudicar al feto. No debe utilizarse durante el embarazo. TABE no debe ser utilizado por mujeres lactantes. Si está embarazada o en período de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarlo consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

**TABE contiene lactosa:** TABE comprimidos contiene lactosa (un tipo de azúcar). Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### 3) ¿Cómo tomar TABE?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.

En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

TABE se comercializa en comprimidos de 60 mg.

- En adultos la dosis usual como analgésico y antiinflamatorio es de 60 mg de loxoprofeno sódico de 1 a 3 veces por día (1 a 3 comprimidos por día cada 8 horas). TABE debe tomarse por vía oral.

- En los casos agudos, como analgésico y antiinflamatorio, se podrá administrar 1 dosis única de 60 o 120 mg (1 a 2 comprimidos). TABE debe tomarse por vía oral.

- Es su médico quien le debe prescribir la dosis más adecuada, según su edad y los síntomas que presente.

- La dosis máxima recomendada es de 180 mg por día (3 comprimidos por día).

- **Si toma más TABE del que debiera:** En caso de sobredosis accidental, consulte a su médico o acuda al Centro de urgencias más próximo.

- **Si olvidó tomar TABE:** Si olvida una dosis de TABE, tómela en cuanto se acuerde a menos que sea casi el momento de tomar la siguiente. En tal caso, sáltese la dosis olvidada y tome la siguiente a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

### 4) Posibles efectos adversos:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos aunque no todas las personas lo sufran.

Deje de tomar este medicamento y contacte inmediatamente a su médico o acuda al hospital si sufre alguno de los siguientes efectos adversos:

*Los principales efectos adversos son:* Síntomas digestivos, molestias estomacales, abdominales, dolor de estómago, náuseas, vómitos, falta de apetito, hinchazón (edema), rash, urticaria, somnolencia.

*Otras reacciones:* shock, anemia hemolítica, dermatostomatitis (síndrome de Steven Johnson), esclerodermosis erosiva pluriorificial, trastornos renales, neumonitis intersticial, constipación, acidez, úlcera péptica, dispepsia, cefalea, resultados anormales de las pruebas de laboratorio, palpitaciones, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular.

Si sufre cualquier efecto adverso, infórmele a su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto.

### 5) Conservación de TABE:

- Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase y en el blíster.

- Conservar en lugar seco a temperatura entre 15°C y 30°C.

### 6) Contenido del envase e información adicional:

Composición de TABE: El principal activo es loxoprofeno sódico. Cada comprimido contiene 60 mg de loxoprofeno sódico.

Los demás componentes son hidroxipropilcelulosa de baja sustitución, estearato de magnesio, óxido de hierro rojo, lactosa monohidrato.

**MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde: 0800-333-1234.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 57.307

Director Técnico: Gastón L. Landsman, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 30/8/19



**Laboratorios Bernabó**

Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, CABA., Tel.: (011) 4501-3278/79, [www.laboratoriosbernabo.com](http://www.laboratoriosbernabo.com)

Elaborado en: Colectora Ruta Panamericana Ramal Pilar Km 36 N° 3863, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

